

SACCULECTOMIE

ABLATION D'UN OU DES DEUX SACS ANAUX

**BLOC
QUEST**
VÉTÉRAIRE
Une équipe de chirurgiens proches de vous

DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La sacculectomie est une chirurgie qui consiste à retirer l'un ou les deux sacs anaux. Elle est indiquée en cas d'abcès récidivants malgré plusieurs traitements antibiotiques ou de tumeur périnanale. La castration peut également être indiquée en cas de suspicion de tumeur hormonodépendante.



Avant la chirurgie

Mise à **jeun** la veille :

- retirer la nourriture à 20h
- laisser l'eau pour la nuit

Le **promener** avant de le déposer à la clinique, pour ses **besoins hygiéniques**

Un **bilan sanguin pré-anesthésique** est conseillé afin de limiter notamment le risque anesthésique



Le post-opératoire

- **Collerette/collier lune indispensable** le temps de la cicatrisation de la plaie (15 jours)
- Traitement **antibiotique** et **anti-inflammatoire** par voie orale (voir ordonnance)



La convalescence

L'**activité** devra être **limitée** pendant **15 jours** :

- Sorties uniquement en laisse
- Pas d'interactions avec les congénères
- **Soins locaux** avec **désinfections** en cas de souillure de la plaie

Les complications possibles :

Faible saignement de la plaie possible pendant les 24h post-opératoires.

Difficulté pour déféquer possible les premiers jours post-opératoires.

Infection en cas de non respect du traitement antibiotique ou de léchage.

Déhiscence des plaies par léchage ou signe du traineau ; une reprise chirurgicale peut être indiquée.

En cas d'apparition de complications, un contrôle chez le vétérinaire traitant sera nécessaire.

Les contrôles post-opératoires à prévoir :

