

LUXATION DE LA PATELLE

La luxation de la patelle est le plus souvent médiale et congénitale chez les petites races mais peut être médiale ou latérale et d'origine traumatique chez les races plus grandes.



DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La stabilisation de la patelle nécessite un examen radiographique (parfois un scanner) préopératoire afin de comprendre l'origine de la luxation et proposer un traitement chirurgical adapté.



Avant la chirurgie

Mise à **jeun** la veille :

- retirer la nourriture à 20h
- laisser l'eau pour la nuit

Le **promener** avant de le déposer à la clinique, pour ses **besoins hygiéniques**

Un **bilan sanguin pré-anesthésique** est conseillé afin de limiter notamment le risque anesthésique



Le post-opératoire

- **Collerette indispensable** le temps de la cicatrisation de la plaie (10 jours)
- Traitement **antibiotique** et **anti-inflammatoire** par voie orale (voir ordonnance)



La convalescence et la rééducation

- **Activité limitée** pendant **2 mois** :
 - en intérieur : pas d'accès au canapé, lit ou escaliers. confinement dans un espace restreint lors de vos absences
 - en extérieur : sorties uniquement en laisse courte, au pas, lentement, même pour les besoins dans le jardin
- **Rééducation** indispensable dès le lendemain de la chirurgie :
 - **balades en laisse courte** au pas, lentement
 - 10 à 15 min , 3 à 4 fois par jour
 - pendant au moins 2 mois
- Aide à la récupération, à partir de 2 semaines post opératoires
 - physiothérapie, hydrothérapie

Les complications possibles :

Infection en cas de non-respect du traitement antibiotique ou de léchage.

Oedème par défaut de rééducation ou en l'absence d'anti-inflammatoires.

Déhiscence de la plaie en cas de léchage.

Récidive de la luxation en cas de saut ou de course au cours des 2 mois postopératoire.

Boiterie intermittente, en particulier après un effort important ou par temps froid et humide, en cas de lésions arthrosiques importantes.

En cas d'apparition de complications, un contrôle chez le vétérinaire traitant sera nécessaire.

Les contrôles post-opératoires à prévoir :

10 jours

Retrait des points de suture et de la collerette

1 mois

Contrôle clinique +/- radiographique

2 mois

Contrôle clinique +/- radiographique