

RTCF CHEZ LE CHIEN

GESTION CHIRURGICALE DES ANOMALIES DE LA HANCHE (LUXATION, FRACTURE ET DYSPLASIE)

**BLOC
OUEST**
VÉTÉRINAIRE
Une équipe de chirurgiens proches de vous

DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La Résection de la Tête et du Col Fémoral (RTCF) est une chirurgie orthopédique qui consiste à retirer la tête et le col fémoral, et à suturer les muscles du bassin et de la cuisse pour assurer le maintien du membre par rapport au bassin ; il s'agit d'une alternative à la réduction et stabilisation chirurgicale ou à la prothèse totale de hanche.



Avant la chirurgie

Mise à **jeun** la veille :

- retirer la nourriture à 20h
- laisser l'eau pour la nuit

Le **promener** avant de le déposer à la clinique, pour ses **besoins hygiéniques**

Un **bilan sanguin pré-anesthésique** est conseillé afin de limiter notamment le risque anesthésique



Le post-opératoire

- **collerette/collier** **lune indispensable** le temps de la cicatrisation de la plaie (10 jours)
- traitement **antibiotique** et **anti-inflammatoire** par voie orale (voir ordonnance)
- ! Appui du membre opéré à chaque pas dès 10 jours postopératoires. Sinon de la physiothérapie est fortement recommandée



La convalescence et la rééducation

- **Activité limitée** pendant **2 mois** :
 - en intérieur : pas d'accès au canapé, lit ou escaliers
 - en extérieur : sorties uniquement en laisse courte, même pour les besoins dans le jardin
- **Rééducation** indispensable :
 - dès le lendemain de la chirurgie
 - **balades en laisse courte** au pas, lentement
 - 10 à 15 min
 - 3 à 4 fois par jour
 - jusqu'à disparition complète de la boiterie (2 à 3 mois)
- Une **boiterie** sera présente pendant cette période, et diminuera progressivement

Les complications possibles :

Infection en cas de non-respect du traitement antibiotique ou de léchage.

Oedème par défaut de rééducation ou en l'absence d'anti-inflammatoires.

Déhiscence de la plaie en cas de léchage.

Boiterie persistante par déchirure musculaire en cas de sauts ou de courses, ou au contraire défaut de rééducation.

En cas d'apparition de complications, un contrôle chez le vétérinaire traitant sera nécessaire.

Les contrôles post-opératoires à prévoir :

10 jours

Contrôle visuel de la plaie
+/- retrait des points cutanés
Retrait de la collerette

1 mois

Contrôle clinique :
la boiterie doit diminuer

2 mois

Contrôle clinique :
la boiterie doit être
intermittente ou absente