FRACTURES CHEZ LE CHAT

DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La réparation des fractures peut se faire de différentes manières : fixateur externe, ostéosynthèse par plaque et vis, broches, cerclages etc. Une étude radiographique précise de la fracture est réalisée en pré-opératoire, afin de prévoir le montage orthopédique le plus adapté.

Avant la chirurgie

Mise à **jeun** la veille :
- retirer la nourriture à 20h
- laisser l'eau pour la nuit

Un **bilan sanguin pré-anesthésique** est conseillé afin de limiter notamment le risque anesthésique

Radiographies thoraciques préopératoires pour vérifier l'absence de hernie diaphragmatique.

Post-opératoire

- **Collerette indispensable** le temps de la cicatrisation de la plaie (10 jours)

- Traitement **antibiotique** et **anti-inflammatoire** par voie orale (voir ordonnance)

Convalescence

- **Activité limitée pendant 2 mois :**
  - sorties interdites
  - pas de jeux
  - limiter les sauts >1m
  - confiner votre animal dans une chambre en votre absence

- **cryothérapie** : application éventuelle de froid sur la zone opérée (15 min 2 à 3 fois par jour en protégeant la peau d'une serviette éponge

Rééducation

Déplacements attendus dès les premiers jours post opératoires :
- appui sur le membre opéré attendu dans les 10 jours post opératoires
- amélioration de la boiterie tout au long de la convalescence

Aide à la récupération, à partir de 2 semaines post opératoire :
- physiothérapie
- hydrothérapie

Prendre conseil auprès du vétérinaire traitant

Les complications possibles :

Infection / déhiscence en cas de non-respect du traitement antibiotique ou de léchage.
Oedème par défaut de rééducation ou en l'absence d'antiinflammatoires.
Retard de cicatrisation / rupture du montage en cas de sortie extérieure ou de saut > 1m au cours des 2 premiers mois.

En cas d'apparition de complications ou de boiterie soudaine , un contrôle chez le vétérinaire traitant sera nécessaire.

Les contrôles post-opératoires à prévoir :

10 jours — Retrait des points de suture et de la collerette

1 mois — Contrôle clinique +/- radiographique

2 mois — Contrôle clinique +/- radiographique