

URÉTROSTOMIE PÉRINÉALE

GESTION DES OBSTRUCTIONS RÉCIDIVANTES DE L'URÈTRE



DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'urétrostomie périnéale consiste à créer un nouvel orifice urinaire en abouchant l'urètre pelvien (dont le diamètre est plus large) à la peau du périnée, après amputation de l'urètre pénien et du pénis. Elle permet de lever les obstructions urinaires mécaniques récidivantes




Avant la chirurgie

Mise à **jeun** la veille :

- retirer la nourriture à 20h
- laisser l'eau pour la nuit

Ne pas laisser sortir votre chat à partir de 20h la veille de la chirurgie.

Un **bilan sanguin pré-anesthésique** est conseillé afin de limiter notamment le risque anesthésique



Le post-opératoire

- **Collerette indispensable** le temps de la cicatrisation de la plaie (15 jours)
- Traitement **antibiotique** et **anti-inflammatoire** par voie orale (voir ordonnance)



La convalescence

L'**activité** devra être **limitée** pendant **15 jours** :

- Accès extérieur interdit
- S'assurer qu'il **urine** régulièrement
- Remplacer la litière par des morceaux de papier journal ou d'essuie-tout
- **Retirer le couvercle du bac à litière.**

Une alimentation adaptée sera conseillée.

Les complications possibles :

Déhiscence de la plaie en cas de léchage ; une reprise chirurgicale peut être indiquée.

Infection en cas de non respect du traitement antibiotique.

En cas de persistance de difficultés à émettre des urines, un contrôle est recommandé.

En cas d'apparition de complications, un contrôle chez le vétérinaire traitant sera nécessaire.

Les contrôles post-opératoires à prévoir :

